

## Protocoles référencés dans la littérature

Traitement adjuvant sans anthracycline ou métastase d'emblée	Traitement adjuvant par anthracycline sans taxane	Traitement adjuvant par anthracycline et taxane
<b>Monothérapie :</b> - anthracycline ou taxane - anthracycline suivie de taxane	<b>Monothérapie :</b> - reprise anthracyclines - docétaxel toutes les 3 semaines - paclitaxel hebdomadaire	<b>Monothérapie :</b> - capécitabine - gemcitabine - vinorelbine - reprise taxane ou anthracycline selon intervalle libre
<b>Association<sup>[1]</sup> :</b> - anthracycline + taxane - FEC	<b>Association<sup>[1]</sup> :</b> - bévacizumab + paclitaxel - docétaxel + gemcitabine - paclitaxel + gemcitabine - docétaxel + capécitabine - paclitaxel + carboplatine - anthracycline + taxane - docétaxel + vinorelbine	<b>Association<sup>[1]</sup> :</b> - gemcitabine + vinorelbine - capécitabine + vinorelbine - sels de platine + gemcitabine
	<b>Thérapies ciblées si HER2+ :</b> - trastuzumab en 1 <sup>ère</sup> ligne - pertuzumab en 1 <sup>ère</sup> ligne - trastuzumab+lapatinib à partir de la 3 <sup>ème</sup> ligne - lapatinib +capécitabine - trastuzumab-emtansine (T-DM1) en 2 <sup>ème</sup> ligne	<b>Thérapies ciblées si HER2- :</b> - capécitabine + bévacizumab - paclitaxel + bévacizumab

1. Toutes les associations n'ont pas bénéficiées d'essai de phase III, il s'agit alors d'accord d'experts.